

## PROGESTIN ONLY PILLS (POPs) COUNSELING HANDOUT

### **What are Progestin Only Pills?**

They are birth control pills that contain just one hormone, a progestin. They are also called “mini-pills” and can be used by clients who shouldn’t use estrogen-containing pills.



### **How do they work?**

They work by making cervical mucus thicker, so sperm cannot reach the egg, and by making the lining of the uterus thinner. Sometimes they stop ovulation (release of egg).

### **How effective are they?**

Typical use: 8 out of 100 clients will become pregnant in one year.

When used consistently and correctly: 3 out of 1000 clients will become pregnant in one year.

### **What are the advantages?**

- They decrease menstrual flow and the risk for anemia, menstrual cramps, endometriosis, pelvic inflammatory disease (PID), endometrial cancer.
- Usually can be used by clients who cannot use estrogen-containing pills.
- Are easier to take than combined pills since every day you take the same kind of pill and there are no hormone-free pills.
- Nursing mothers can take progestin-only pills when the baby is 1 month old.
- Can be used by clients who smoke and are over 35 years old.
- Ability to get pregnant returns quickly after stopping the pills.

### **What are the disadvantages?**

- POPs do not protect you from HIV or other sexually transmitted diseases. Use condoms if you are at risk.
- Irregular bleeding is the most common problem. There may be spotting between periods, or periods may be very short and scanty.
- You have to remember to take a pill **around the same time (within 3 hours)** every single day.
- The failure rate is a bit higher than with regular birth control pills – but they are still very effective.

### **WARNING SIGNS:**

See your doctor or nurse if you have these or any other signs or concerns: severe abdominal pain, heavy bleeding, repeated, very painful headaches, or depression.

### **Emergency Contraception**

If you had sex and did not use contraception, call the office for Emergency Contraception to prevent pregnancy up to 5 days after unprotected sex.

### **If you think you are pregnant:**

Continue taking your pills and seek a pregnancy test (a home test or call the clinic). If your pregnancy test is positive, stop taking the pills.

## PÍLDORAS CON PROGESTINA SOLAMENTE (POPs) HOJA DEL CONSEJERO

### ¿Cuáles son las Píldoras con Progestina Solamente?

Son píldoras anticonceptivas que contienen solamente una hormona, progestina. También son llamadas "minipíldoras" y pueden ser usadas por clientes quienes no pueden usar píldoras que contienen estrógeno.



### ¿Cómo trabajan?

Trabajan haciendo la mucosa cervical más gruesa, para que la esperma no pueda alcanzar el huevo, y haciendo más delgada la cobertura del útero. A veces detienen la ovulación (liberación del huevo).

### ¿Cuán efectivas son?

Uso típico: 8 de cada 100 clientes quedarán embarazadas en un año.

Cuando son usadas consistentemente y de forma correcta: 3 de cada 1000 clientes quedarán embarazadas en un año.

### ¿Cuáles son las ventajas?

- La disminución del flujo menstrual y el riesgo de anemia, cólicos menstruales, endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica (PID), cáncer en el endometrio.
- Usualmente puede ser usado por el cliente que no puede usar píldoras que contienen estrógeno.
- Son más fáciles de tomar que las píldoras combinadas ya que usted toma la misma píldora y no hay píldoras libres de hormonas.
- Las madres que lactan pueden tomar píldoras con progestina solamente cuando el bebé tiene 1 mes de nacido.
- Puede ser usado por clientes quienes fuman o son mayores de 35 años.
- La habilidad de quedar embarazada regresa rápidamente, después de dejar de tomar las píldoras.

### ¿Cuáles son las desventajas?

- POPs no le protegen contra VIH u otras enfermedades de transmisión sexual. Use condones si está en riesgo.
- Sangrado irregular es el problema más común. Puede haber manchado entre reglas o períodos pueden ser muy cortos y escasos.
- Usted tiene que recordar tomar una **píldora al mismo tiempo (dentro de 3 horas)** todos los días.
- El rango de fallo es un poco más alto que con cualquiera píldora anticonceptiva - pero son muy efectivas.

### SIGNOS DE ALERTA:

Vea a su doctor o enfermera si tiene estos o cualquier signo o preocupación: dolor abdominal severo, sangrado agudo, repetido, dolores de cabeza severos, o depresión.

### Anticonceptivos de Emergencia

Si usted tuvo sexo y no usó anticonceptivos, llame a la oficina para Anticonceptivos de Emergencia para evitar un embarazo hasta 5 días después de haber tenido sexo sin protección.

### Si usted cree que está embarazada:

Continúe tomando las píldoras y hágase una prueba de embarazo (en el hogar o la clínica). Si la prueba da positivo, deje de tomar las píldoras.